СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ Е.А.НЕПОКЛОНОВ
_____
18 АВГ 2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Лучший друг гельмистоп для дегельминтизации взрослых собак и кошек, щенков и котят
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,117437, г. Москва, ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Лучший друг гельмистоп (Luchiy drug gelmistop).

Международное непатентованное наименование: фенбендазол и пирантел.

2. Лучший друг гельмистоп в качестве действующих веществ содержит фенбендазол и пирантела памоат. Выпускают препарат в двух дозировках: 500 мг (для взрослых кошек и собак), содержащих в 1 таблетке 250 мг фенбендазола и 75 мг пирантела памоата; и 200 мг (для котят и щенков), содержащих 50 мг фенбендазола и 15 мг пирантела памоата и вспомогательные вещества: лактозу, соответственно – 75 мг и 35 мг и карбоксиметилцеллюлозу – 100 мг.

3. По внешнему виду препарат представляет собой плоские таблетки светло – желтого цвета с разделительными бороздками.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение Лучший друг гельмистоп по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 2, 4 или 6 таблеток в стрипы из ламинированной бумаги, упакованные поштучно в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от минус 10 °С до 20 °С.

6. Лучший друг гельмистоп следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лучший друг гельмистоп относится к комбинированным антигельминтным лекарственным препаратам.

10. Комбинация фенбендазола и пирантела памоата, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в том числе Toxocara canis, Toxocara mistax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum, Echinococcus granulosus, Alveococus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum, Multiceps multiceps. Механизм антигельминтного действия основан на ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель паразитов и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

При пероральном введении фенбендазол частично всасывается в кишечнике и выводится из организма в основном с фекалиями и в меньшей степени с мочой в течение 24 – 48 часов. Пирантела памоат практически не всасывается и выводится из организма в основном в неизмененном виде с фекалиями.

Лучший друг гельмистоп по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносятся собаками и кошками разных пород и возраста.

III. Порядок применения

11. Лучший друг гельмистоп назначают взрослым кошкам и собакам, котятам и щенкам с 3-недельного возраста с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез, анкилостомоз), цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не подлежат дегельминтизации истощенные и больные инфекционными болезнями животные, самки в первой половине беременности, щенки и котята моложе 3-недельного возраста.

13. Лучший друг гельмистоп применяют животным индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма (в куске колбасы, мяса, с фаршем, кашей) в дозе:

взрослым собакам и кошкам – 1 таблетка массой 500 мг на 5 кг массы животного;

котятам и щенкам – 1 таблетка массой 200 мг на 1 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям однократно; при сильной степени инвазии обработку рекомендуется повторить через 10 дней.

С профилактической целью дегельминтизацию проводят в терапевтической дозе ежеквартально, а также за 10 – 14 дней перед каждой вакцинацией.

14. При передозировке у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

15. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Не подлежат обработке самки в первой половине беременности, щенки и котята моложе 3-недельного возраста. При необходимости беременным самкам препарат назначают за 3 недели до предполагаемых родов, кормящим самкам – через 2-3 недели после родов под наблюдением ветеринарного врача.

17. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

18. При применении препарата Лучший друг гельмистоп в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и симптоматическую терапию.

19. Лучший друг гельмистоп не следует применять одновременно с пиперазином и средствами, ингибирующими холинэстеразу.

Информация о несовместимости с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

20. Лучший друг гельмистоп не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Лучший друг гельмистоп следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

22. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Лучший друг гельмистоп. В случае

появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.
Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Дирофен таблеток, утвержденная Россельхознадзором от 17 апреля 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-7.12-2754 № ПВР-3-5.1/00849

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН» А.А. Смирнов